

tions of the bilateral internal carotid arteries were not able to be found. Eventually the entire cerebral hemisphere was supplied by the vertebrobasilar system via the posterior communicating artery. The narrowed supraclinoid portion of the left internal carotid artery was confirmed by surgery of the left posterior cerebellar artery-posterior communicating artery aneurysm.

This case may provide an important suggestion about the mechanism of the persistence of the primitive trigeminal artery. In an embryo, at the stage of 5-6mm embryo in size, the posterior communicating

artery begins to develop and then PTAs begin to dwindle. If the C1-or C2- portion of the internal carotid artery is gradually occluded, the forebrain, which has to be supplied by the internal carotid system, must be supplied retrogradely by the basilar system via the posterior communicating artery. At this stage, however, the vertebral artery has not developed enough to supply the entire central nervous system. Therefore, the PTA can not regress and this results in the postnatal persistence of the primitive trigeminal artery.

(Received: November 20, 1987)

〈追加〉

本誌掲載の次の論文

「溝測 光, 有光哲雄, 栗坂昌宏, 森 惟明: 子癇病に続発した脳室内出血の1例. 脳外 16: 517-522, 1988」

において, 当方の手違いにより下記の論文を参考文献として掲載することができなかったのここに改めて追加させていただきます.


「高橋 弘, 中沢省三, 今屋久俊: 子癇に伴う特異的CTについて. CT研究 7(6): 677-682, 1985」

1988年7月18日 溝測 光


世界で最も軽い, 安い。

カットフィルムチェンジャー

New-TAC



1. 新しいTACは本体の重量がDK(大角判) 38kgと軽量小形です。
4(四切判) 28kg
2. 軽量なのでUタイプは各社支持アームに簡単に組合せられ支持軸に対して360°のすべての方向からの撮影が可能です。
3. スマートな専用架台S型は手軽に使用できます。
4. F.L.E架台と組合せると拡大, ステレオ等がスムーズに行います。
5. A形サブライマガジンをセットすると交互撮影が出来ます。
6. 本機2台組合せてパイプレン撮影が出来ます。



(カタログ贈呈)

株式会社

マツキ製作所

東京都渋谷区代々木3-13-10
〒151 TEL (03) 379-1178(代)