

原 著

高位腹膜切開による transabdominal preperitoneal approach (TAPP) と

内鼠径輪切開による TAPP の比較検討 蛭川浩史・他 ● 47

症例報告

癒着性腸閉塞に鼠径ヘルニア嚢からアプローチし腹腔鏡下癒着剝離術を施行した 1 例

..... 峠 弘治・他 ● 56

メッシュを用いた Sandwich 法で修復し得た再発横隔膜ヘルニアの 1 例 福田美月・他 ● 62

TEP 施行時に診断した Amyand's hernia の 1 例 渡邊将広・他 ● 70

麻酔覚醒時に再発し再度腹腔鏡下修復術を行った肥満成人の

Bochdalek 孔ヘルニアの 1 例 北野 拓・他 ● 76

腹腔鏡下スリーブ状胃切除術後リチウム中毒をきたした 1 例 山本 寛・他 ● 84

CT 画像の変化を観察しえた Winslow 孔ヘルニアに対して腹腔鏡下手術を

施行した 1 例 河埜道夫・他 ● 90

文献抄録

The Influence of Intraoperative Blood Loss on Fistula Development Following

Pancreatoduodenectomy

[Trudeau MT, Casciani F, Maggino L, et al. Ann Surg 276 : e 527-535, 2022] 井手貴雄・他 ● 98

● Letter to the Editor 96

● 「日本内視鏡外科学会雑誌」投稿時のチェックリスト 99

● 編集後記 100