

ADL	activities of daily living	日常生活動作
AVF	arteriovenous fistula	自己血管使用皮下動静脈瘻
AVG	arteriovenous graft	人工血管使用皮下動静脈瘻
BMI	body mass index	
BUN	blood urea nitrogen	血中尿素窒素
CKD	chronic kidney disease	慢性腎臓病
CKD-MBD	chronic kidney disease-mineral and bone disorder	慢性腎臓病に伴う骨・ミネラル代謝異常
Ccr	creatinine clearance	クレアチニンクリアランス
Cr	creatinine	クレアチニン
CRP	C reactive protein	C 反応性蛋白
DOPPS	Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study	
eGFR	estimated glomerular filtration rate	推算糸球体濾過量
ESA	erythropoiesis stimulating agent	赤血球造血刺激因子製剤
GFR	glomerular filtration rate	糸球体濾過量
Hb	hemoglobin	ヘモグロビン
HbA1c	hemoglobin A1c	ヘモグロビン A1c (=グリコヘモグロビン)
HD	hemodialysis	血液透析
HDF	hemodiafiltration	血液透析濾過
J-DOPPS	Japan-Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study	
KDIGO	Kidney Disease : Improving Global Outcomes	
KDOQI	Kidney Disease Outcomes Quality Initiative	
PD	peritoneal dialysis	腹膜透析
PTH	parathyroid hormone	副甲状腺ホルモン
QOL	quality of life	生活の質

■次号予告

臨床透析 6 月号

(2020 年 6 月 10 日発行予定)

OPINION

千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学 服部 憲幸

特集●透析患者の脳血管障害

- | | | |
|------------------------|---------------------------|-------|
| 1. 透析患者の脳血管障害の疫学 | 宮崎大学医学部血液・血管先端医療学講座 | 戸井田達典 |
| 2. 脳血管障害の診断 | 九州大学大学院医学研究院病態機能内科学 | 吾郷 哲朗 |
| 3. 脳血管障害の危険因子とその管理 | | |
| (1) 血圧 | 飯塚病院腎臓内科 | 藤崎毅一郎 |
| (2) 貧血および ESA 治療 | 九州大学大学院医学研究院病態機能内科学 | 四枝 龍佑 |
| (3) CKD-MBD | 九州大学大学院病態腎・高血圧・脳血管内科 | 山田 俊輔 |
| (4) 脂質異常症 | 大阪市立大学大学院医学研究科血管病態制御学 | 庄司 哲雄 |
| 4. 心房細動例に対する抗凝固療法 | 奈良県立医科大学腎臓内科学 | 鶴屋 和彦 |
| 5. 頸動脈狭窄症に対する治療 | 京都大学医学部附属病院脳神経外科 | 大川 将和 |
| 6. 脳出血に対する急性期治療 | 宮崎大学医学部病態解析医学講座救急・災害医学分野 | 落合 秀信 |
| 7. 脳梗塞に対する急性期治療 | 国立循環器病研究センター病院脳血管内科・脳神経内科 | 豊田 一則 |
| 8. くも膜下出血に対する急性期治療 | 兵庫医科大学脳神経外科 | 吉村 紳一 |
| 9. 脳血管障害急性期の透析法 | 奈良県立医科大学腎臓内科学 | 江里口雅裕 |
| 10. 脳血管障害に対するリハビリテーション | 国立国際医療研究センターリハビリテーション科 | 藤谷 順子 |
| 11. 無症候性脳血管障害 | 大阪市立大学大学院医学研究科泌尿器病態学 | 長沼 俊秀 |
- (編集の都合により掲載内容が若干変更となることがあります)